CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE AUTISMO 2020

EL APOYO A LA INFANCIA CON AUTISMO

Joaquin Fuentes Biggi
Irma Isasa Finó

Donostia / San Sebastián, 3 de marzo de 2022

1

GUIÓN:

1. Frecuencia
2. Diagnóstico
3. Preguntas habituales
4. Apoyo en general
5. Aspectos particulares
6. Aportaciones...

2

3

4

5

6

ASDEU – Estudio de campo en Gipuzkoa

Alumnado de 7 a 9 años

Prevalencia estimada de TEA: 0,59% (IC95% 0,48-0,70)

Territorio de Gipuzkoa

Organización Mundial de la Salud **0,6%**

7

¿Y AHORA QUÉ ESTA PASANDO EN GIPUZKOA?

8

9

10

11

12

13

COMPARTEN ALGO (TEA) Y SON DIFERENTES EN TODO LO DEMÁS...

EN UN ESPECTRO: MUY DISTINTOS EN SUS SÍNTOMAS Y EN SU IMPACTO

LOS SÍNTOMAS SE VAN DESARROLLANDO POCO A POCO Y VAN CAMBIANDO CON EL TIEMPO

14

*Aunque no hay dos casos iguales, los síntomas clásicos que se aprecian desde los primeros 12 - 24 meses de vida son un **decreciente interés por las personas del entorno, escaso disfrute en fijar recíprocamente la mirada, limitada respuesta a su nombre, escaso desarrollo de la comunicación, y reacciones sensoriales y emocionales difíciles de explicar.***

Nunca se trata de una ausencia total y permanente, sino de una progresiva pobreza de estas habilidades que antes se iban desarrollando. De hecho, siguen apareciendo puntualmente, pero en menor cantidad de lo esperable.

*En otros casos, las dificultades se detectan cuando son más mayores, a partir de los tres - cuatro años, por su **limitación en el desarrollo de la auténtica conversación con los demás, las rutinas, el pobre juego de fantasía y la menor capacidad para compartir experiencias y emociones.***

15

**NO EXISTEN SIGNOS "PATOGNOMÓNICOS" Y COINCIDE
CON OTROS TRASTORNOS DEL DESARROLLO**

**EL DIAGNÓSTICO ES CLÍNICO Y SE "APOYA" EN
PRUEBAS ESPECÍFICAS**

**EL DIAGNÓSTICO NOS AYUDA A ENTENDER EL TRASTORNO
PERO NO A CONOCER AL NIÑO O LA NIÑA**

16

**PERSONALIZACIÓN – VALORACIÓN INDIVIDUAL
DE LA PERSONA Y SU ENTORNO**

17

- Familiares tienen mayor riesgo de síntomas subclínicos
- Repetición de TEA en nuevos hermanos y hermanas: 10%
- Aparición de T. del Neurodesarrollo en hermanos y hermanas: 20%
- 3 - 4 veces mayor riesgo en hermanos que en hermanas
- 65% de repetición en gemelos (iguales genéticamente)

PERO...

**HERENCIA COMPLEJA ACUMULATIVA DE VARIACIONES COMUNES
EN TODA LA POBLACIÓN QUE CAUSAN UN PEQUEÑO EFECTO EN
EL RIESGO Y VARIACIONES RARAS QUE AÑADEN RIESGO, PERO
QUE NO LO DETERMINAN...**

18

35.000 exomas completos incluyendo 12.000 de personas con TEA:

102 presuntos genes - variaciones raras heredadas o "de novo" - asociadas con el riesgo de TEA (53 TEA y 49 TEA+RD). Mutaciones 25-35%.

X-Fragil: <10%; MECP2 (Rett); PTEN

Microarray... y si no está disponible, cariotipo

Futuro: secuenciación completa (exoma, genoma)

<https://doi.org/10.1007/s00787-020-01587-4>

19

Exploración neuropediátrica e historia familiar

- Detección de enfermedades raras
- Identificación de variaciones communes

Avance del conocimiento científico (*¿los demás...?*)

20

HARVARD
Department of Stem Cell
and Regenerative Biology

**Massachusetts
Institute of
Technology**

“Organoide cerebral”

Mutación en:
SUV420H1
ARID1B
CHD8

Tienen un mismo efecto
en el desarrollo cerebral

Paola Arlotta

Nature (02/02/2022)

21

¿Qué se sabe de su esperanza de vida?

Estudio masivo en Suecia:

27.122 personas con TEA vs. 2.672.180 personas del registro general
Edad de mortalidad tras igualarlos en edad, sexo y área de residencia

Esperanza de vida media de la población general: 70 años
Esperanza de vida media de la población con TEA: 53 años

Subgrupo de nivel bajo: 39 años
Subgrupo de nivel alto: 54 años

Causas: Epilepsia, Suicidio, Problemas de Corazón y Cáncer

DEFICIENTE ATENCIÓN SANITARIA

<https://doi.org/10.1192/bjp.bp.114.160192>

22

¿Qué se sabe de su esperanza de vida?

¡No son los casos de ahora! Muchas personas han arrastrado un doble problema: haber tenido autismo y no haber sido apoyadas a lo largo de su vida.

No existe, que conozcamos, ninguna causa específica para la mortalidad prematura en el autismo. Únicamente la limitada atención.

DEBEMOS ASEGURAR UN EXQUISITO CUIDADO SANITARIO DESDE LA PRIMERA INFANCIA Y A LO LARGO DE LA VIDA...

ELIMINAR LAS BARRERAS PARA SU SALUD

23

Tackling Healthcare Access Barriers for Individuals with Autism from Diagnosis to Adulthood: A Review

Childhood (0-17)	Transition (~16-25)	Adulthood (>18)
<ul style="list-style-type: none"> Limited expertise/capacity for ASD screening & diagnosis Lack of awareness of—or insufficient insurance coverage for—genetic screening following diagnosis Lack of clarity around referral pathways 	<ul style="list-style-type: none"> No/incomplete implementation of HCT services Lack of clarity around the appropriate use of HCT services for higher functioning individuals Suboptimal physician awareness of healthcare needs/considerations for providing care to individuals with ASD 	<ul style="list-style-type: none"> Communication difficulties between physicians and adults with ASD Shortage of services/ limited insurance to address mental health co-morbidities Suboptimal awareness from stakeholders of healthcare needs of aging adults with ASD

AGE

Common Barriers Encountered Throughout the Lifespan:

- Social stigma related to characteristics and capabilities of individuals with ASD
- Limited awareness or knowledge of best healthcare pathways for ASD
- Scarcity of healthcare/resources in native languages
- Shortage and high cost of ASD-related healthcare services

<https://doi.org/10.1038/s41390-021-01465-y>

24

-

Autism: 2.610.000.000 resultados
Autismo: 74.500.000 resultados

PubMed® es un motor de búsqueda de 33 millones de trabajos científicos

25

APOYO EN EL AUTISMO INFANTIL

**EL APOYO LO DAN QUIENES “JUEGAN EL PARTIDO”:
QUIENES CONVIVEN, CONOCEN Y QUIEREN
AL NIÑO O A LA NIÑA**

LOS TÉCNICOS SOMOS SUS ENTRENADORES

26

PRINCIPIOS GENERALES DEL APOYO

- 1. Identifica pronto y evalúa con instrumentos**
- 2. Considera cada individuo, cada familia como única**
- 3. Enfoca las fortalezas individuales, no solo las limitaciones**
- 4. Basa tu intervención en el análisis funcional del comportamiento**
- 5. Construye una comunidad “amistosa” para el autismo**
- 6. El tratamiento eficaz no se rige por el número de sesiones**
- 7. Re-define el papel profesional y de la persona**
- 8. Intervén en contextos naturales y regulares**
- 9. Respeta los derechos individuales**
- 10. Establece modos de acceso y coordinación de agencias clave**

27

APOYO EN EL AUTISMO INFANTIL

El intervenir pronto puede mejorar:

- Las habilidades de comunicación social
- La gravedad de los síntomas
- El desarrollo del niño o la niña
- El estrés y el bienestar de los padres

28

APOYO EN EL AUTISMO INFANTIL

- **Construir competencias:**
Atención compartida, imitación, turnos, juego, autoregulación, comunicación recíproca, bienestar, desarrollo
- **Minimizar barreras:**
Comprensión individual, anticipación, selección, estructuración, ayudas visuales, afrontar los problemas específicos
- **Optimizar el entorno de cada día:**
Adaptación sensorial, entornos hogareños amistosos

Tiempos individuales + oportunidades naturales

29

- Aspectos particulares

1.Sueño

2.Alimentación

3.Trastornos asociados

30

Estrategias para Mejorar el Sueño de los Niños con Trastornos del Espectro Autista

Guía para los Padres

autism speaks

Muestra Visual de Rutina de la Hora de Dormir

- Proporcionar un entorno cómodo para dormir
- Establecer rutinas regulares para la hora de acostarse
- Mantener un horario regular
- Enseñar a su hijo a dormirse solo
- Promover conductas diurnas

<https://www.autismspeaks.org/sites/default/files/2018-10/sleep-booklet-spanish.pdf>

31

• Secreción anormal de Melatonina en niños y niñas con TEA

Day/night urinary melatonin metabolite (6SMT) excretion rates (Mean±SD)

Group	Day (microgram/hr)	Night (microgram/hr)
Control	~0.35	~1.15
Autism	~0.10*	~0.55*

* p<0.05

Total 24h urinary 6SMT excretion (median)

Group	6SMT microgram/24 hours
Control	~8.8
Autism	~4.8*

Cortesía de la Prof. Carmen Schroeder (2019)

32

• **Slenyto®**

Minitabletas de eliminación prolongada de Melatonina

1 y 5 mg.

Precios:
1 mg [30] – 30 €
5 mg [30] – 145 €

No cubierto por el Sistema Nacional de Salud
Requiere receta médica
Disponible en Gipuzkoa: a partir del 7/03/2022

33

• **La Pica**

Guía Para Padres

Guía para tratar el estreñimiento en niños:

Kit de herramientas para los padres

Guía para padres

Estudio de las conductas alimentarias en el autismo

70% rechazan probar
50% tienen rituales

<https://www.autismspeaks.org/recursos-en-espanol>

34

•

Lorena Maza Tealimento Facebook

La Selectividad Alimentaria puede darse por los diferentes factores:

- Olores
- Texturas
- Sabor
- Temperatura
- Color

35

•

Autismo y medicamentos para conductas desafiantes

Uso seguro y cuidadoso

Guía para familias de niños con autismo

**Anticonvulsivos
Y Melatonina - SÍ**

**Otros medicamentos
(TDAH, Irritación)
son muy raros antes
de los 6 -7 años**

36

GUIÓN:

1. Frecuencia
2. Diagnóstico
3. Preguntas habituales
4. Apoyo en general
5. Aspectos particulares
6. Aportaciones...

Eskerrik Asko!